



蝴蝶簡介

第2章

2.1

鳳園蝴蝶保育區之 生物多樣性

鳳園谷擁有極高生態價值以及蝴蝶品種多樣性，早於八十年代已被列為「具特殊科學價值地點」，而在 2004 年推出的「新自然保育政策」中列出的 12 個「須優先加強保育地點」當中，鳳園更位列第四位。截至 2025 年 12 月，本會已經在鳳園紀錄過 224 種蝴蝶，佔全香港蝴蝶（共 249 種）90%。

除了蝴蝶普查，保育區也在 2005 年起委託香港觀鳥會開展鳥類普查，以及委託香港中文大學生物系進行針對蝴蝶寄主植物及蜜源植物的植物普查。保育區亦委託 C&R Wildlife 總監蛾類專家 Dr. Roger C. Kendrick，到鳳園進行蛾類普查。生態監察及普查對象亦包括夜行性兩棲及爬行類動物、蜂類、淡水魚以及其他昆蟲。

截至 2025 年 12 月鳳園曾紀錄的物種：

類別	品種數目	類別	品種數目
植物	484	鳥類	129
蝴蝶	224	淡水魚	11
蛾類	1076	兩棲類	13
蜻蜓	39	爬行類	40
蜜蜂及胡蜂	61	哺乳類	20
甲蟲	165		

2.2

鳳園常見生物圖鑑

擬阿勇蛞蝓科 Ariophantidae

樹棲蝸牛

Megaustenia imperator
Arboreal Snail

描述：本種樹棲蝸牛十分常見，廣泛分布於全港。其外型與一般蝸牛十分不同，其外殼有軟組織覆蓋（覆蓋程度於不同個體上有差異）。較常見於溫暖及潮濕的月份，常棲息於樹幹上以至樹上高處，在冬季會躲藏於落葉堆中。



園蛛科 Araneidae

大木林蜘蛛

Nephila pilipes
Giant Wood Spider

描述：本地常見的大型蜘蛛，一般在郊外遇到的是雌性，體長可達 5 厘米，足部展開時有 15 厘米寬，而雄蛛體型則很細小。雌蛛的頭胸部及腹部為黑色，表面有金黃色及灰白色斑紋，有人認為斑紋狀似人面，故又有人面蜘蛛之稱。另外足肢近關節處呈鮮黃色。雌性所結的網可達 1 米或以上闊，有能力捕捉較大的動物。



蜜蜂科 Apidae

東方蜜蜂

Apis cerana
Asian Honey Bee

描述：香港最常見的原生蜜蜂，分布廣泛。胸部為黑色，被有黃毛，而腹部為顯眼的黃黑相間紋理。東方蜜蜂與不少蜂類一樣，具有組織分明的社會結構，群體中有專責繁殖的蜂后及雄蜂，以及負責覓食、育幼，及防衛的工蜂，亦即是我們平常觀察到的個體。蜜蜂通常築巢於樹洞或岩壁中的空隙等洞穴內。由於蜜蜂擁有有毒的螫針，觀察時需注意安全，切勿刺激牠們及蜂巢。



胡蜂科 Vespidae

棕馬蜂

Polistes gigas
Giant Brown Paper Wasp

描述：本地最常見的馬蜂之一，同時為最大的馬蜂。體型粗壯，全身紅褐色，在強光照下有金屬光澤，腹部顏色較深，呈黑色。與蜜蜂同為社會性昆蟲，喜歡於較陰暗的位置築巢，例如枝葉密集的樹木或灌木叢或已荒廢的屋子內。蜂群數量小，每巢約有 10 至 20 隻個體。頭部有一對大顎，用於捕食。棕馬蜂與大部分馬蜂一樣，只捕食蝴蝶及蛾的幼蟲。棕馬蜂為比較溫馴的群居蜂，除非巢穴受到嚴重騷擾，否則不會主動攻擊，但由於棕馬蜂擁有有毒的螫針，觀察時需注意安全，切勿刺激牠們及蜂巢。



山丘高地

有部分蝴蝶有登峰的習性，例如電蛺蝶和金斑蛺蝶。由於同一物種的蝴蝶會在同一時間登峰，大大增加了牠們找到伴侶的機會，亦減少了牠們用在尋找伴侶的時間和力氣。當雄蝶登上山後，會先在空中盤旋，尋找視野良好的位置等待雌性到來。雌性登峰後覓得心儀的雄性並交配後，會回到低地產卵。



生物多樣性不僅存在於郊區，良好綠化管理的市區，同樣為許多蝴蝶提供了理想的棲息環境，城市因此成為市民與自然生態共享的空間，也是學習自然生態的理想場所。許多蝴蝶善於利用城市環境進行繁殖、覓食和休息，這些環境包括河流、人工湖和海岸線等水資源，公園、蝴蝶園、植物園、行道樹和坡地等樹林，以及開花樹木、花壇和盆栽等蜜源。

2.8

市區常見蝴蝶圖解指南

鳳蝶科 Papilionidae

玉帶鳳蝶

Papilio polytes
Common Mormon



出沒月份

1-12 月

展翅長度

80-90 mm

香港十分常見的鳳蝶，於市區亦十分普遍，全年可見。翅膀主要為黑色，前翅邊緣有白色斑點，後翅中央則有白點連成帶狀，因而得名。另一型態「白斑型」（Form polytes）的雌蝶前翅淡色，後翅的白色帶狀斑紋變成橢圓狀，並有紅色斑點。成蟲主要以花蜜為食物。幼蟲寄主植物為柑橘及兩面針等芸香科植物。



鳳蝶科 Papilionidae

玉斑鳳蝶

Papilio helenus
Red Helen



出沒月份

1-12 月

展翅長度

90-110 mm

香港十分常見的鳳蝶，於市區亦十分普遍，全年可見。翅膀主要為黑色，後翅有三塊白色斑紋和紅色的新月形斑紋。雌蝶整體顏色比較淡，後翅翅底的紅色斑紋較發達。成蟲主要以花蜜為食物。幼蟲寄主植物為柑橘、兩面針及筋欖花椒等芸香科植物。

鳳蝶科 Papilionidae

美鳳蝶

Papilio agnor
Great Mormon



出沒月份

2-12 月

展翅長度

110-130 mm

香港常見鳳蝶之一，在市區亦頗常見，除一月外基本上全年可見。雄蝶無翅尾，翅膀主要為黑色並帶有閃藍色，翅膀腹面近身體處有紅色斑紋。雌蝶前翅顏色較淡，後翅有大片白色斑，並分為有尾型（Form achates）和無尾型（Form agenor）。成蟲主要以花蜜為食物。幼蟲寄主植物為柑橘及柚等芸香科植物。